

Overzicht van wijzigingen in de Vilans KICK- protocollen

(Periode juli 2011 - februari 2012)

Nieuwe protocollen

datum	Naam protocol	VH	Opdracht arts
	<i>Injecteren</i>		
Dec 11	Injecteren van Tauredon intramusculair bij clienten met reuma		x
Nov 11	Injecteren van hepatitis B-vaccin (HBVAXPRO) intramusculair	VH	x
Juli 11	Injecteren Betaferon subcutaan	VH	x
Juli 11	Injecteren groeihormoon Norditropin FlexPro subcutaan met pen	VH	x
Juli 11	Injecteren Forsteo Colter subcutaan met injectiepen	VH	x
Juli 11	Injecteren insuline subcutaan met Humalog Kwikpen	VH	x
Juli 11	Subcutaan inbrengen van Acc-Chek Tenderlink, aankoppelen van infuuspomp	VH	x
	<i>Nier en blaaskatheterisatie</i>		
Dec 11	Katheterspoelen met TwinBag spoelzakje		
	<i>Sondevoeding</i>		
Jan 12	Toedienen sondevoeding via PEJ-sonde met pomp		
	<i>Puncties</i>		
Dec 11	Vingerprik voor meten van bloedglucosewaarde met Bayers Glucolet 2		
Okt 11	Vingerprik voor meten van bloedglucosewaarde met een prikpen		
Okt 11	INRwaarde bepalen met de CoaguChek-XS©		
Juli 11	Vingerprik meten bloedglucosewaarde met eenmalige vingerprikker		
	<i>Heelkunde</i>		
Sept 11	Zwachtelen onderbeen met één lange rek zwachtel		
Sept 11	Zwachtelen onderbeen met UrgoK2		
	<i>Tracheacanule</i>		
Juli 11	Aan- en afsluiten CPAP		
	<i>Lichaamsverzorging en observatie</i>		
Sept 11	Maken van een ECG		
Sept 11	Wegen met een rolstoelweegschaal		

datum	Naam protocol	VH	Opdracht arts
Juli 11	Temperatuur opnemen met een oorthermometer (was alleen voor de Genius; nu algemeen)		

Richtlijnen en wetgeving

Hygiënerichtlijnen

Laatste actualisatie	Januari 2011
Nov 2011	In het document handschoenen is opgenomen, hoe je steriele handschoenen aantrekt. Elk protocol waarin handschoenen worden gebruikt, verwijst naar dit document.

Wet BIG

Laatste actualisatie	Mei 2011
Nov 2011	<i>Verpleegkundig specialisten mogen nu ook medicatie voorschrijven. Dit is 1 november in de kamer besloten. De informatie over de Wet BIG zal daarop worden aangepast.</i>

Cytostaticarichtlijnen

Laatste actualisatie	Juni 2011
Dec 2011	Het handboek Veilig omgaan met cytostatica in de thuiszorg van het Integraal Kankercentrum West is door het Integraal Kankercentrum Limburg herschreven. Inhoudelijk is het niet veranderd, maar het is nu ook geschikt voor intramuraal. I.v.m. de fusie van de Integrale Kankercentra worden in 2012 alle producten geïnventariseerd die door regionale centra zijn geschreven. Bepaald wordt welke richtlijnen als landelijk gaan gelden en waaraan landelijk aandacht gegeven moet worden. Het handboek Cytostatica is er daar één van.
Juli 2011	De richtlijnen (2008) zijn gecontroleerd en er is contact geweest met de IKC's. Waarschijnlijk komt er in 2012 een herziene landelijke richtlijn. Nb. FAOT heet nu A+O VVT. De nieuwe website: www.aovvt.nl

Medicatie landelijke richtlijnen IVM/DGV/VenVN/Actiz/VGN/GGZ

Laatste actualisatie	Juli 2011
Juli 2011	Richtlijn Handreiking Werkvoorraad geneesmiddelen, Actiz, GGZ Nederland, VGN, januari 2011.

Protocollen en achtergrondinformatie

Injecteren

Laatste actualisatie	September 2011
Okt 2011	De dubbele controle van de medicatie is toegevoegd aan elk protocol over het injecteren van medicatie, het medicatieoverzicht is gewijzigd in toedienlijst.

Juli 2011	In protocol subcutaan injecteren Fraxiparine toegevoegd dat de fabrikant anders adviseert dan de normale loodrechttechniek: Neem huidplooi, steek naald loodrecht in huidplooi en houd huidplooi gedurende de handeling vast: resultaat gelijk.
-----------	---

Infuusbehandeling

Laatste actualisatie	November 2010
Nov 2011	<p>Nieuwe richtlijn bloedtransfusie en de transfusiegids (CBO 2011) zijn verwerkt:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ De arts van zorgorganisatie (naast medisch specialist) als opdracht gever toegevoegd. Daar waar relevant expliciet de rol van de specialist ouderengeneeskunde genoemd. ▪ Infuuslang moet 12 uur na de toediening vervangen worden (was 6 uur) ▪ Dubbele controles explicieter beschreven in het protocol. ▪ De term bloedgroep wordt in de richtlijn gebruikt voor de bloedgroep inclusief de Rhesusfactor. Dit is zo overgenomen en toegelicht. ▪ Verwijzing naar checklist die gebruikt kan worden om de cliënt te informeren toegevoegd.

Blaaskatheterisatie

Laatste actualisatie	Januari 2010
Jan 2012	Samenhang in achtergronddocumenten verbeterd. Apart document voor de observatiepunten en complicaties voor zowel eenmalige katheter als verblijfskatheter.
Jan 2012	<p>Nieuwe richtlijnen (WIP en Verenso) verwerkt ten aanzien van reinigen schaamstreek bij vrouw. In richtlijnen staat momenteel: reinig schaamstreek met 3 streken van boven naar beneden, richting perineum, gebruik steeds een nieuw gaas.</p> <p>Van binnen naar buiten, wordt niet meer in richtlijn genoemd en is verwijderd.</p>
Jan 2012	Blaascan: de richtlijn van Verenso over werkwijze naar aanleiding van gevonden hoeveelheid residu, verwerkt.
Aug 2011	Uit de richtlijn van Verenso Langdurige blaaskatheterisatie bij patiënten met complexe multimorbiditeit is de aanbeveling om zure spoelvoeistof voor katheterspoelen te gebruiken overgenomen.
Juli 2011	<p>Verenso heeft een nieuwe Richtlijn Langdurige blaaskatheterisatie bij patiënten met complexe multimorbiditeit uitgegeven (2011). De inhoud van de protocollen is vergeleken en aangepast. Het volgende is gewijzigd:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ gebruik glijmiddel ook voor vrouwen ▪ Wachtijd na inbrengen van glijmiddel met anestheticum: 5 - 7 minuten (was 3-5 minuten) ▪ Katheter bij vrouwen nog 2 cm en bij mannen nog 5 cm opschuiven als urine verschijnt. ▪ Wijze van inbrengen van de katheter bij de man is aangepast: eerst inbrengen tot weerstand, dan penis naar beneden en dan verder opschuiven tot urine verschijnt (en daarna nog 5 cm).

Sondevoeding

Laatste actualisatie	November 2011
Dec 2011	Verenso komt binnen enkele weken met een handreiking voor de rol van de

	specialist ouderengeneeskunde bij het controleren van de neus/ maagsonde.
Nov 2011	PEG-katheter gewijzigd in PEG sonde. Maagsonde vervangen door Neus-maagsonde. Naamgeving overal gelijk getrokken.
Nov 2011	Protocol toedienen Losec Mups via sonde verwijderd. Protocol Toedienen medicijnen via sonde is het algemene protocol dat is aangepast aan de nieuwe richtlijn Neusmaagsonde van V&VN
Nov 2011	<p>1 november is de nieuwe richtlijn Neusmaagsonde van V&VN aangeboden aan ministerie. De richtlijn moet nog geautoriseerd maar is al wel beschikbaar: Nieuwe-richtlijn-voor-neusmaagsondes</p> <p>De strekking van de richtlijn voor volwassenen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bepaal de in te brengen lengte van de neusmaagsonde NEX (exacte ligging mbv tabel) ▪ Controleer de ligging van de sonde na inbrengen mbv het opzuigen van maagsap en zuurgraad meten met behulp van pH indicator. Het afkappunt is 5.5. Bij pH-waarde ≤ 5.5 ligt sonde in maag en kan sondevoeding toegediend. Nb auscultatie is geen veilige methode. ▪ Wanneer geen maagsap opgezogen kan worden, overleg met arts hoe te handelen. ▪ Nadat de juiste ligging is vastgesteld, kunnen de volgende controles bij toedienen van voeding, plaatsvinden door: nagaan of sonde niet verschoven is adhv markering op de sonde of ruimte van de fixatiepleister en inspectie van de mond-keelholte. Bij twijfel wel pH-waarde bepalen ▪ Is sonde verschoven, na overleg met arts, sonde verwijderen en nieuwe inbrengen . <p>Voor de kinderen zijn specifieke richtlijnen opgenomen. Deze richtlijnen zijn vergelijkbaar met de uitgangspunten voor volwassenen. Echter er zijn meerdere tabellen opgenomen om de juiste in te brengen lengte van de sonde te bepalen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ De voorkeurs methode is gerelateerd aan leeftijd en lichaamslengte van het kind. ▪ Tweede methode is de NEM (neuspunt-oorlel-halverwege punt borstbeen en navel. <p>Ook afkappunt van pHwaarde bij kinderen is 5.5.</p> <p><i>Protocollen en achtergrondinformatie zijn hierop aangepast.</i></p>

Puncties

Laatste actualisatie	Juni 2011
----------------------	-----------

Heelkunde

Laatste actualisatie	Geplande actualisatie: februari 2012
aug 2011	In de titel van het protocol zwachtelen met lange-rek zwachtels is aangegeven dat het om een protocol gaat waarbij 2 lagen lange-rek zwachtels worden gebruikt. Er is een nieuw protocol gemaakt voor het zwachtelen met 1 lange-rek zwachtel. <i>NB. Over de wijze van zwachtelen bestaat geen consensus. Maak afspraken met voorschrijver over de werkwijze</i>

Tracheacanule

Laatste actualisatie	Januari 2010
----------------------	--------------

Zuurstof

Laatste actualisatie	September 2010
Nov 2011	Dubbele controle toegevoegd, het aantal toe te dienen liters, de berekening van de resthoeveelheid in de cilinder.

Vernevelen

Laatste actualisatie	Geplande actualisatie: januari 2012
Okt 2011	In de protocollen de toedienlijst voor medicatie van de apotheker toegevoegd aan de benodigdheden.

Toedienen van medicijnen

Laatste actualisatie	Mei 2011
Dec 2011	Oogdruppelen: nieuwe richtlijn van het oogziekenhuis Rotterdam verwerkt. Na druppelen traanbuis 1 minuut afdrukken ipv 1 - 3 minuten. Animatiefilmpjes toegevoegd voor instructie aan cliënt.
Nov 2011	Achtergrondinformatie over toedienlijst, medicatieoverzicht toegevoegd.
Aug 2011	Rivotril toedienen: Protocol is aangepast en de drie mogelijkheden van toediening zijn beschreven: <ul style="list-style-type: none">▪ met een lepeltje op de onderlip▪ met spuitje in de wangzak▪ met een lepel en extra vloeistof
Juli 2011- Sept 2011	In het document medicatieveiligheid zijn de termen overgenomen en toegelicht uit de richtlijn Overdracht medicijngegevens: Toedienlijst, Medicijnopdracht en Medicijnoverzicht. Deze termen zijn ook in de protocollen overgenomen. De toedienlijst is aan de benodigdheden toegevoegd. De informatie over dubbele controle is in een apart document ondergebracht, zodat het gemakkelijker te raadplegen is. De documenten Medicatieveiligheid en Dubbele controle zijn aan alle protocollen gelinkt, waarin medicijnen worden toegediend.

Lichaamsverzorging en observatie

Laatste actualisatie	Januari 2010
Dec 2011	Decubitus. De landelijke richtlijn Decubitus van V&VN is verwerkt in de informatie over decubitus. In de nieuwe richtlijn: <ul style="list-style-type: none">▪ de definitie decubitus is iets aangepast▪ decubitus graden zijn vervangen door decubitus categorieën▪ vochtletsel is gewijzigd in incontinentie dermatitis▪ risicoscoreinstrument van CBO wordt niet meer genoemd (wel Braden en Norton; maar beide worden gezien als een handvat, niet als een gevalideerd instrument)▪ ALTIS en TIME zijn toegevoegd als methode om de decubitus te beoordelen en te beschrijven.
Aug 2011	Nieuwe multidisciplinaire richtlijn Smetten (intertrigo) Preventie en behandeling van V&VN van juli 2011 is opgenomen. Opgenomen zijn: <ul style="list-style-type: none">▪ Praktijkkartaat Preventie▪ Praktijkkartaat Behandeling▪ Patiënten folder▪ Volledige richtlijn▪ Verantwoording van de richtlijn

Wijzigingen:

- Bij risicofactoren zijn toegevoegd: diabetes en tekortschieten in hygiëne
- Voor de behandeling zijn de fasen 1, 2, 3 en 4 zijn gewijzigd in:
 - Smetten
 - Smetten met nattende huid
 - Smetten met geïnfecteerde huid

Met ieder zijn specifieke behandeling, die verder niet inhoudelijk is gewijzigd.